

FLUIMUCIL®

N-acétylcistéine

Forme :

granulé buvable.

Composition :

N-acétylcistéine :.....200 mg

Excipients q.s.p :.....3 g

Sort du médicament :

La N-acétylcistéine après administration par voie orale est rapidement absorbée. L'affinité particulière du tissu pulmonaire et des sécrétions bronchiques pour cette molécule permet d'obtenir des concentrations actives de 3 heures environ après la prise du médicament. L'élimination de l'acétylcistéine et de ses métabolites se fait essentiellement par le rein.

Propriétés :

FLUIMUCIL® exerce une action fluidifiante intense et rapide sur les sécrétions muqueuses et mucopurulentes par réduction des ponts disulfures des mucoprotéines, et dépolymérisation des macromolécules d'acide nucléique.

FLUIMUCIL® dans les infections bronchopulmonaires complète l'action des antibiotiques et diminue le risque de récurrence dû à la stase des sécrétions et à l'insuffisance ventilatoire.

FLUIMUCIL® favorise l'expectoration en augmentant l'activité mucociliaire.

Indications :

Affections des voies respiratoires accompagnées d'une abondante sécrétion de mucus.

Pneumologie :

Bronchites, Trachéobronchites, Prévention des complications respiratoires des maladies infectieuses, Bronchorrhées, Emphysèmes, Bronchites chroniques.

ORL :

Sinusites, Catarrhe tubaire.

Contre-indications :

ulcère gastro-duodéal.

Tolérance :

FLUIMUCIL® bénéficie d'une bonne tolérance gastro-intestinale. Il possède une saveur agréable et il est bien accepté par les enfants.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons (moins de 2 ans) : 1/2 sachet 2 fois par jour.
Enfants jusqu'à 7 ans : 1 sachet 2 fois par jour.
Enfants de plus de 7 ans et adultes : 1 sachet 3 fois par jour.

Présentation :

Boîte de 30 sachets dosés à 200 mg.